



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
60 - 834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego

Spis treści:

Spis treści:	1
Wstęp	1
Znieczulenie:.....	Error! Bookmark not defined.
Średni czas trwania zabiegu:	2
Wskazania do zabiegu:	2
Średnia długość pobytu w szpitalu:	2
Dzień zabiegu:	2
Dzień po zabiegu:	2
Drugi dzień po zabiegu:	2
Odwiedziny:	2
Dalsze postępowanie:	2

Wstęp

Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. W powłokach brzusznych wykonuje się 3 otwory (5-10 mm), przez które wprowadza się kamerę i narzędzia potrzebne do wykonania zabiegu. Wyrostek zostaje wycięty i usunięty przez jedno z nacięć. Po zabiegu zostają jedynie 3 niewielkie blizny w miejscu nacięcia. W większości wypadków zabieg udaje się wykonać laparoskopowo, jednak czasami konieczna jest konwersja do techniki klasycznej.

Znieczulenie:

Ogólne.

Średni czas trwania zabiegu:

30-60 minut

Wskazania do zabiegu:

Zapalenie wyrostka robaczkowego.

Średnia długość pobytu w szpitalu:

3-4 dni.

Dzień zabiegu:

Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. Po wykonaniu badań diagnostycznych pacjent operowany jest w dniu przyjęcia.

Dzień po zabiegu:

Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).

Drugi dzień po zabiegu:

W większości przypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do drugiego dnia po operacji (czasem dzień dłużej). Przed wypisem pacjent jest badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.

Odwiedziny:

W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.

Dalsze postępowanie:

Po wyjściu ze szpitala pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po ok. 7 dniach od wyjścia ze szpitala pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy.