

	<b>Przygotowanie pacjenta na badanie tomografii komputerowej</b> Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	Wydanie Strona Kopia	01 1/2
	<b>Załącznik 3 do I-R.003</b>	Ważne od	01.06.2023

## Przygotowanie do badania tomografii komputerowej:

1. Do badania bez podania środka cieniującego nie jest wymagane szczególne przygotowanie.
2. Przed badaniem z podaniem środka cieniującego wymagane jest przygotowanie Pacjenta:
  - Pozostanie na czczo, czyli bez przyjmowania posiłków 6h przed badaniem.
  - Nie ma ograniczeń w picu wody. Zalecane jest wcześniejsze zwiększenie ilości przyjmowanych płynów (około 1,5 litra już w przeddzień badania- rekomendowana jest woda niegazowana).
  - Pacjenci przyjmujący leki powinni przyjąć je zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je wodą niegazowaną, nie później niż 1 godzinę przed badaniem.
  - W celu oceny funkcji nerek należy wykonać z krwi badanie stężenia kreatyniny oraz poziomu eGFR  
Czas oznaczenia wyników:
    - W ciągu 7 dni przed podaniem środka kontrastowego u pacjentów ze stwierdzoną chorobą nerek, lub w przypadku pacjentów hospitalizowanych.
    - W ciągu 3 miesięcy przed podaniem środka kontrastowego u wszystkich pozostałych pacjentów.
  - Pacjenci leczeni farmakologicznie z powodu choroby tarczycy powinni wykonać badanie stężenia TSH. Badanie należy wykonać nie wcześniej, niż 2 tyg. przed terminem badania.
    - W przypadku stężenia TSH poniżej dolnej granicy normy, niezbędna jest pisemna zgoda endokrynologa, internisty lub lekarza kierującego na podanie kontrastu jodowego.
  - Pacjenci z cukrzycą przyjmujący metforminę:
    - Pacjenci z eGFR >30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> i bez oznak AKI, otrzymujący środki kontrastowe dożylnie lub otrzymujący środek kontrastowy dotętniczo z wtórną ekspozycją nerkową: należy kontynuować normalne przyjmowanie metforminy.
    - Pacjenci z eGFR <30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, otrzymujący środek kontrastowy dożylnie lub dotętniczo z wtórną ekspozycją nerkową, lub otrzymujący środek kontrastowy dotętniczo z pierwotną ekspozycją nerkową, lub z AKI:  
Należy zaprzestać przyjmowania metforminy od momentu podania środka kontrastowego. Należy oznaczyć eGFR w ciągu 48 godzin, a jeśli czynność nerek nie ulegnie istotnej zmianie, wówczas można ponownie rozpocząć przyjmowanie metforminy.

## Co ze sobą przynieść?

- Aktualne skierowanie na badanie lub numer e-skierowania.
- Dokument tożsamości ze zdjęciem.
- Wyniki kreatyniny.
- Wynik TSH jeśli zachodzi taka konieczność.
- Poprzednie wyniki badań radiologicznych USG, RTG, TK, MR – opis oraz płyta CD.
- Okulary.